

DISPLASIA CERVICAL

Arizona Department of Corrections
Health Service Bureau

Inmate Wellness Program
HEP 1037S- 01/06

Displasia Cervical

La displasia puede ocurrir a cualquier edad desde la pubertad en adelante. Suele darse en mujeres entre las edades de 25 y 35.

Durante un examen ginecológico, un proveedor podrá encontrar que el tejido del interior de la cerviz de la mujer (el cuello del útero) está cambiado. Esta condición se llama displasia.

La displasia cervical puede ser el primer paso en la formación de cáncer en la cerviz. El cáncer cervical es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres.

SINTOMAS

Normalmente no hay síntomas visibles. Para encontrar un desperfecto en la cerviz, un proveedor debe hacerle un examen Papanicolaí. Por eso, el hacerse las pruebas Papanicolaí es la clave para diagnosticar esta condición.

PREVENCION

El virus de papiloma humano (vea la hoja informativa sobre Verrugas Genitales), una infección de contagio sexual, es responsable por la mayoría, sino todos, de los casos de cáncer cervical. Esta enfermedad puede transmitirse mediante simple contacto de piel con una área infectada (ya sea entre genitales, o contacto entre manos y genitales). Aparte de la abstinencia, el único método seguro de protección es hacerse operar de las verrugas antes de tener contactos íntimos. También, otras enfermedades de contagio sexual (STDs), como el SIDA, pueden relacionarse con la displasia cervical.

Conductas más sanas en las relaciones sexuales, incluyendo la monogamia y uso de condones, y otros hábitos, reducen el potencial para contagiar la displasia cervical.

TRATAMIENTO

Ud. debería presentarse para un examen pélvico una vez al año, de ser posible, puesto que el cáncer de la cerviz puede ser tratado y curado cuando se encuentra temprano. Si le han diagnosticado la displasia cervical, Ud. y su proveedor médico tendrán que decidir sobre el tratamiento.

Factores de Riesgo

Los factores de riesgo incluyen:

- Relaciones sexuales a temprana edad (menor de 18 años de edad)
- Partos tempranos (menor de 16 años de edad)
- Múltiples compañeros sexuales.
- Enfermedades de transmisión sexual-- especialmente virus de papiloma humano (verrugas genitales), VIH, infecciones de herpes genital

Uso de anticonceptivos orales

"Este documento es una traducción del texto del original escrito en inglés. Esta traducción no es una traducción oficial y no está comprometiendo en este estado o una subdivisión política de este estado."